

旭健推第420号
平成29年10月10日

医療機関の長 様

旭川市保健所長 谷田 光弘
(健康推進課担当)

ペストに係る注意喚起について

本市の保健衛生行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、標記の件につきまして、厚生労働省健康局結核感染症課から、マダガスカル共和国の都心部を含む複数の地域において肺ペストが発生している旨の通知がありました。

つきましては、マダガスカル共和国からの入国者については肺ペストを念頭に置いた診療をしていただくとともに、感染した疑いのある患者が発生した場合には、旭川市保健所に報告をお願いします。

なお、本通知内容については、旭川市ホームページからダウンロードすることができます。

1 ペストの臨床的特徴

リンパ節炎、敗血症を起こし、重症例では高熱、意識障害などを伴う急性細菌性感染症であり死に至ることも多い。臨床的所見により以下の3種に分けられる。

(1) 腺ペスト(ヒトペストの80~90%を占める)

潜伏期は2~7日。感染部のリンパ節が痛みとともに腫れる。菌は血流を介して全身のリンパ節、肝や脾でも繁殖し、多くは1週間くらいで死亡する。

(2) 敗血症ペスト(約10%を占める)

時に局所症状がないまま敗血症症状が先行し、皮膚のあちこちに出血斑が生じて全身が黒色となり死亡する。

(3) 肺ペスト

ペスト菌による気管支炎や肺炎を起こし、強烈な頭痛、嘔吐、39~41℃の弛張熱、急激な呼吸困難、鮮紅色の泡立った血痰を伴う重篤な肺炎像を示し、2~3日で死亡する。

2 感染経路

ペスト菌に感染したノミに咬まれることによって人へうつります。また、肺に感染すると患者の咳によって、容易に人から人へうつります。

3 届出等連絡先

旭川市保健所(健康推進課保健予防係) TEL 25-9848(日中直通) FAX 26-7733
26-1111(夜間代表)

4 掲載ページ

旭川市ホームページ上の、「ホーム>事業者向け>健康・福祉・子育て>医療機関・薬局>お知らせ>感染症に関する通知 平成29年度」に掲載

<http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/iryoukikanyakkyoku/osirase/d061974.html>

(連絡先)

健康推進課保健予防係

阿部・松浦

TEL 25-9848 FAX 26-7733