

ワクチン類の保管温度

(平成 29 年 8 月現在)

製剤名と有効期間

保管条件

インフルエンザ HA ワクチン【製造日から15箇月・1年】*

成人用沈降ジフテリアトキソイド【3年】

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド【2年】

沈降破傷風トキソイド【2年】

組換え沈降B型肝炎ワクチン【2年】

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン【製造日から2年・27箇月】*

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(ソークワクチン)混合ワクチン【製造日から30箇月】

沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン【2年】

水痘抗原【2年】

遮光して、凍結を避けて10℃以下

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン【製造日から3年】

乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン【3年】

乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン【3年】

乾燥ガスえそウマ抗毒素【10年】

乾燥ジフテリアウマ抗毒素【10年】

乾燥はぶウマ抗毒素【10年】

乾燥ボツリヌスウマ抗毒素【10年】

乾燥まむしウマ抗毒素【10年】

遮光して、10℃以下

乾燥 BCG ワクチン【2年】

精製ツベルクリン【3年】

10℃以下

肺炎球菌ワクチン(23価多糖体)【製造日から2年】

遮光し凍結を避けて8℃以下

乾燥ヘモフィルスb型ワクチン【製造日から3年】

黄熱ワクチン【24箇月】

遮光して2~8℃

沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン【製造日から3年】

凍結を避け2~8℃

組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン【製造日から4年】

組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン【製造日から3年】

不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)【製造日から3年】

4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリアトキソイド結合体)【製造日から2年】

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン【製造日から3年】

5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン【製造日から2年】

遮光し凍結を避けて2~8℃

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン【1年・18箇月】*

乾燥弱毒生水痘ワクチン【2年】

乾燥弱毒生風しんワクチン【2年】

乾燥弱毒生麻疹ワクチン【1年】

乾燥弱毒生麻疹風しん混合(MR)ワクチン【1年・製造日から18箇月】*

遮光して、5℃以下

生ワクチン(経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンは除く)は凍結可(添付溶剤の瓶破損に注意)

●有効期間で○年表記しているものは、国家検定合格日からの期間を表す。

製剤ラベルの最終有効年月日を確認すること。

※メーカーによって異なるため、使用に際しては添付文書を確認すること。

(冷蔵庫に貼るなどしてご使用ください。)



一般社団法人 日本ワクチン産業協会

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-14-4

内神田ビルディング4階

TEL (03) 6206-9660 FAX (03) 6206-9661

ホームページ <http://www.wakutin.or.jp/> Eメール mail@wakutin.or.jp