

ヒブ感染症の予防接種の接種方法

接種開始時期	初回接種	追加接種
生後2月から生後7月に至るまでの間	<p>生後12月に至るまでの間に27日（医師が必要と認める場合は20日）以上の間隔をおいて3回接種 ただし、2回目、3回目は生後12月に至るまでに行い、超えた場合は接種しない（追加接種は可）。</p> <p>【標準的な接種】 生後12月に至るまでの間に27日（医師が必要と認める場合は20日）以上56日までの間隔をおいて3回接種</p>	<p>初回接種終了後7月以上の間隔をおいて1回接種 ただし、初回3回目の接種が生後12月までに完了せずに、生後12月以降に追加接種を行う場合は、初回終了後、27日（医師が必要と認める場合は20日）以上の間隔をおいて1回接種</p> <p>【標準的な接種】 初回終了後7月以上、標準的には13月までの間隔をおいて1回接種 ただし、初回2回目の接種が生後12月までに完了せずに、生後12月以降に追加接種を行う場合は、初回終了後、27日（医師が必要と認める場合は20日）以上の間隔をおいて1回接種</p>
<p>上記が標準的な接種 以下は標準的な接種開始時期以外に開始した場合の接種方法</p>		
生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間	<p>生後12月に至るまでの間に、27日（医師が必要と認める場合は20日）以上、標準的には56日までの間隔をおいて2回接種 ただし、2回目は生後12月に至るまでに行い、超えた場合は接種しない（追加接種は可）。</p>	<p>初回接種終了後7月以上、標準的には13月までの間隔をおいて1回接種 ただし、初回2回目の接種が生後12月までに完了せずに、生後12月以降に追加接種を行う場合は、初回終了後、27日（医師が必要と認める場合は20日）以上の間隔をおいて1回接種</p>
生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間	1回接種	なし