

# 令和6年度 病虫害防除実施予定調査票（6月以降実施予定分）

実施予定の有無（有・無）＊○を付して下さい。

たいせつ 農業協同組合（鷹栖支所）

| 実施者            | 実施予定日          | 実施予定時間 | 防除の方法         | 散布対象ほ場の所在地 | 実施面積（ha） | 対象作物  | 対象病虫害           | 薬品の名称・農薬名       | 備考             |
|----------------|----------------|--------|---------------|------------|----------|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| 東鷹栖地域<br>小麦作付者 | 6月上旬           | 全日     | へり（有・無）<br>陸上 | 東鷹栖地区全域    | 175.2    | 秋まき小麦 | 赤かび病<br>赤さび病    | シルバキュアフロアブル     | 開花始            |
| 東鷹栖地域<br>小麦作付者 | 6月上旬           | 全日     | へり（有・無）<br>陸上 | 東鷹栖地区全域    | 175.2    | 秋まき小麦 | 赤かび病<br>赤さび病    | ミラビスフロアブル       | 開花始～1週間後       |
| 東鷹栖地域<br>小麦作付者 | 6月上旬           | 全日     | へり（有・無）<br>陸上 | 東鷹栖地区全域    | 175.2    | 秋まき小麦 | アブラムシ           | トレボン乳剤          | 開花始～1週間後       |
| 東鷹栖地域<br>小麦作付者 | 6月中下旬          | 全日     | へり（有・無）<br>陸上 | 東鷹栖地区全域    | 24.9     | 春まき小麦 | 赤かび病<br>赤さび病    | シルバキュアフロアブル     | 開花始            |
| 東鷹栖地域<br>小麦作付者 | 6月中下旬          | 全日     | へり（有・無）<br>陸上 | 東鷹栖地区全域    | 24.9     | 春まき小麦 | 赤かび病<br>赤さび病    | ミラビスフロアブル       | 開花始～1週間後       |
| 東鷹栖地域<br>小麦作付者 | 6月中下旬          | 全日     | へり（有・無）<br>陸上 | 東鷹栖地区全域    | 24.9     | 春まき小麦 | 赤かび病<br>赤さび病    | シルバキュアフロアブル     | 開花始～2週間後       |
| 東鷹栖地域<br>小麦作付者 | 6月中下旬          | 全日     | へり（有・無）<br>陸上 | 東鷹栖地区全域    | 24.9     | 春まき小麦 | アブラムシ           | トレボン乳剤          | 開花始～2週間後       |
| 東鷹栖地域<br>水稲作付者 | 7月中下旬          | 全日     | へり（有・無）<br>陸上 | 東鷹栖地区全域    | 1,226.20 | 水稲    | いもち病<br>カメムシ    | ダブルカットトレボンフロアブル | 出穂期            |
| 東鷹栖地域<br>水稲作付者 | 7月中下旬          | 全日     | へり（有・無）<br>陸上 | 東鷹栖地区全域    | 665.7    | 水稲    | いもち病<br>カメムシ    | ダブルカットトレボンフロアブル | 出穂期            |
| 東鷹栖地域<br>水稲作付者 | 7月末～<br>8月始    | 全日     | へり（有・無）<br>陸上 | 東鷹栖地区全域    | 1,226.20 | 水稲    | いもち病<br>カメムシ    | ビームエイトスタークルゾル   | 出穂揃い           |
| 東鷹栖地域<br>水稲作付者 | 7月末～<br>8月始    | 全日     | へり（有・無）<br>陸上 | 東鷹栖地区全域    | 665.7    | 水稲    | いもち病<br>カメムシ    | ビームエイトスタークルゾル   | 出穂揃い           |
| 東鷹栖地域<br>水稲作付者 | 8月上中旬          | 全日     | へり（有・無）<br>陸上 | 東鷹栖地区全域    | 1,226.20 | 水稲    | いもち病<br>カメムシ    | キラップフロアブル       | 乳熟期            |
| 東鷹栖地域<br>水稲作付者 | 8月上中旬          | 全日     | へり（有・無）<br>陸上 | 東鷹栖地区全域    | 665.7    | 水稲    | いもち病<br>カメムシ    | キラップフロアブル       | 乳熟期            |
| 東鷹栖地域<br>小麦作付者 | 10月末～<br>11月上旬 | 全日     | へり（有・無）<br>陸上 | 東鷹栖地区全域    | 35.2     | 秋まき小麦 | なまぐさ黒穂病<br>雪腐れ病 | フロンサイドSKY       |                |
| 東鷹栖地域<br>小麦作付者 | 10月末～<br>11月上旬 | 全日     | へり（有・無）<br>陸上 | 東鷹栖地区全域    | 140      | 秋まき小麦 | なまぐさ黒穂病<br>雪腐れ病 | フロンサイドSKY       |                |
| 東鷹栖地域<br>大豆作付者 | 7月下旬           | 全日     | へり（有・無）<br>陸上 | 東鷹栖地区全域    | 115.6    | 大豆    | マメシンクイガ         | ゲットアウトWDG       | 莢伸長始後          |
| 東鷹栖地域<br>大豆作付者 | 8月上旬           | 全日     | へり（有・無）<br>陸上 | 東鷹栖地区全域    | 115.6    | 大豆    | マメシンクイガ         | プレバソンフロアブル5     | 莢伸長始後～<br>1週間後 |

# 病虫害防除実施予定の事前周知方法に関する調査票

たいせつ 農業協同組合 (鷹栖支所)

| 防除方法 | 周知方法等                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有人へリ | ①近隣住宅地区への周知方法<br><br>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）                                                         |
| 無人へリ | ①近隣住宅地区への周知方法<br>新聞折込および本田防除実施前日に広報車による巡回<br><br>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）<br>幼稚園・保育所・学校・福祉施設に対し文章にて通知 |
| 地上散布 | ①近隣住宅地区への周知方法<br>無人へリ同様<br><br>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）<br>無人へリ同様                                     |