

農業センター土づくり通信

第16号【発行】令和7年1月 旭川市農業センター（電話 61-0211）

新年あけましておめでとうございます。

土づくり通信では、今年も皆様に役立つ情報をお伝えしてまいりますので、よろしくお願いします。

さて、生産性を保ちながら、肥料価格の値上がり等の影響を少しでも抑えるためには、土壌診断に基づく土づくりが重要です。今号では、より多くの皆様に活用していただくため、農業センターの土壌診断票の見方を詳しく解説します。

土 壌 診 断 票

(2023年11月1日作成)

旭川市農業センター

TEL 0166-61-0211

農協受付番号
●●〇〇1

農 協 名
神居

農事組合名
花菜里1

農家コード
9999999

氏 名
旭川 大朗

電話番号
61-0211

FAX番号

受付年月日
2023年10月1日

サンプル番号
99991

圃場番号

圃場面積

土壌タイプ
不明

土 性
壤土(L)

腐 植
含む以下

採土時期
収穫跡地

メッシュ番号

備 考
稲わら堆肥(家畜糞尿無) 2t/10a

サンプル名
H-002

前作作物名
サニーレタス

作付予定作物名
小松菜

作 型

1.土壌の化学性

分析項目	分析値	基準値	基準域に対する分析値の位置
pH(H ₂ O)	6.3	6.0 ~ 6.5	
トルオーグリン酸 (mg/100g)	271	15 ~ 30	
交換性石灰 (mg/100g)	333	170 ~ 350	
交換性苦土 (mg/100g)	57	25 ~ 45	
交換性加里 (mg/100g)	37	15 ~ 30	
石灰飽和度(%)	61.9		
塩基飽和度(%)	80.7		
石灰・苦土比	4.2		
苦土・加里比	3.6		

分 析 項 目

分析値

EC(mS/cm)

0.16

CEC(me/100g)

19.2

リン酸吸収係数

456

硝酸態窒素(mg/100g)

3.3

熱水抽出性窒素(mg/100g)

11.1

可溶性銅(ppm)

0.5

可溶性亜鉛(ppm)

34.6

易還元性マンガン(ppm)

239.2

ホウ素(ppm)

0.9

遊離酸化鉄(%)

2.0

リン酸・苦土比(重量比)

4.8

石灰・苦土比(重量比)

5.8

所 見

(監修:上川農業改良普及センター TEL 0166-84-2017)
※不明な点は普及センターまで、御相談下さい。
①土壌pHは適正範囲内ですので、炭カルによる矯正は必要ありません(石灰は基準値の高めの値となっています)。
②リン酸値が高くなっていますので、リン酸含量の少ない肥料を使用して下さい。
③苦土、カリも基準値を若干超えていますので、標準施肥に努めて下さい。
④石灰・苦土比、苦土・加里比は基準内で良い状態です。
⑤硝酸態窒素は基準値内なので、窒素は標準施肥で良いと思われます。
⑥施肥例: NS248 80kg/10a(198g/坪)、サルボマグ 17kg/10a(66.1g/坪)

A

D

C

B

A 基本情報

農業者の氏名、所属農協等の基本情報の他に、以下の情報が記載されています。

土 性	粘土、砂等が含まれる割合によって分類される土壌の性質です。						
	例	粘土と砂の割合	耕耘性	通気性	排水性	保水力	保肥力
	砂壤土(SL)	粘土 15%以下 砂 65-85%	易	中	中	中	中
	壤 土(L)	粘土 15%以下 砂 40-65%	易	中	中	中	中
腐 植	埴壤土(CL)	粘土 15-25% 砂 30-65%	やや難	やや少	小	大	やや大
	作物への養分供給、水分保持、団粒構造の形成など重要な働きをする物質で、堆肥などの有機物が土壌微生物に分解される過程で作られます。土の腐植含量(%)は次のとおり区分します。 「含む以下」…5%未満 「富む」…5～10% 「すこぶる富む」…10%以上						
サンプル名	ほ場番号やハウス名など。						
備 考	依頼者からお聞きした特記事項(堆肥の使用量、生育不良の有無など)。						

B 分析結果(グラフ)

各項目の基準値の範囲 に対する分析値▼を表しています。

pH(H ₂ O)	土を水に懸濁して測定するため、pH(H ₂ O)と表記しています。 作物によって生育に適するpHの幅が異なります。
リン酸 (mg/100g)	作物が吸収できる状態のリン酸が、土壌 100g中に何 mg 含まれているかを表しています。 作物区分により分析方法が異なるので、トルオーグリン酸(水稻苗床、畑作、野菜・花き)、ブレイリン酸(水稻本田、草地)という項目名になります。
交換性石灰・苦土・加里 (mg/100g)	作物が吸収できる状態の石灰、苦土、加里が、土壌 100g中に何 mg 含まれているかを表しています。
石灰飽和度 (%)	土壌が蓄えることのできる肥料分の上限に対して、現在、石灰がどのくらい蓄えられているかを、%で表しています。
塩基飽和度 (%)	土壌が蓄えることのできる肥料分の上限に対して、現在、石灰、苦土、加里(これらを「塩基」といいます。)の合計がどのくらい蓄えられているかを、%で表しています。
石灰・苦土比 苦土・加里比	個別の塩基の量が十分であっても、そのバランスが悪いと作物による吸収が悪くなることがあり、特に「石灰・苦土、苦土・加里」のバランスには注意が必要です。

C 分析結果(表)

窒素や微量元素などの分析値が記載されています。

EC (mS/cm)	土壌に残っている肥料濃度(主に硝酸態窒素)の目安。 土壌の粒度によって基準値が異なり、例えば野菜畑では、粗粒質土壌で0.4以下、中粒質土壌で0.7以下、細粒質土壌で0.8以下が基準値です。 基準値を大きく超えた土壌では作物の生育が悪くなることがあります。
CEC (me/100g)	土壌が蓄えられる肥料分の上限(保肥力)を表します。
リン酸吸収係数	肥料から溶け出したリン酸は、速やかに土壌に吸収・固定され、作物が吸収しにくい状態になります。リン酸吸収係数はその固定力の強さを表す目安です。
硝酸態窒素 熱水抽出性窒素 培養窒素 (mg/100g)	硝酸態窒素(野菜・花き)、熱水抽出性窒素(野菜・花き、畑作)、培養窒素(水稻本田)のように、作物区分によって窒素の評価方法が異なりますが、その年の栽培期間中に作物が吸収可能な窒素です。 最も即効性のある窒素が硝酸態窒素です。
微量元素 (ppm)	作物区分に応じて、ホウ素、マンガン、亜鉛、銅などの微量元素を分析します。
リン酸・苦土比(重量比) 石灰・苦土比(重量比)	(※水稻育苗床土のみ) 苗の異常褐変を防止するための指標です。リン酸の集積や塩基のバランスに注意し、基準値を守るように管理しましょう。

D 所見

農業者向けの所見は上川農業改良普及センターが記載します。

作付予定作物の基準値に合わせて各項目の分析値を検討し、pH矯正の必要性の有無、施肥の方向性(減肥の可能性など)や、施肥設計の例などの所見を作成します。

※ 裏面には、各項目の基準値等を補足した「土壌診断票の見方」を掲載しました。

お手元の土壌診断票と見比べる際に、御利用ください。

なお、土壌分析は通年で受付・実施 しています。
御希望の方は、農業センター(61-0211)又は各農協にお問い合わせください。

サンプル名

土性・腐植

前作作物名・作付予定作物名

備考欄

試料提出時にお知らせいただいた情報を記載
・堆肥や有機質資材の使用量 ・生育不良に係る情報
・ハウスの越冬の有無 ・ほ場の面積 など

土壌診断票の見方

土 壌 診 断 票

(2023年11月1日作成)

旭川市農業センター


TEL 0166-61-0211

農協受付番号	農 協 名	農事組合名	農家コード	氏 名	電話番号	FAX番号	受付年月日	サンプル番号	圃場番号	圃場面積
●●〇〇1	神居	花菜里1	9999999	旭川 太郎	61-0211		2023年10月1日	99991		

土壌タイプ	土 性	腐 植	採土時期	メッシュ番号	備 考
不明	壤土(L)	含む以下	収穫跡地		稲わら堆肥(家畜糞尿無) 2t/10a

サンプル名	前作作物名	作付予定作物名	作 型
H-002	サニーレタス	小松菜	

1. 土壌の化学性



分析結果 (グラフ)

分 析 項 目	分析値
EC(mS/cm)	0.16
CEC(me/100g)	19.2
リン酸吸収係数	456
硝酸態窒素(mg/100g)	3.3
熱水抽出性窒素(mg/100g)	11.1
可溶性銅(ppm)	0.5
可溶性亜鉛(ppm)	34.6
易還元性マンガン(ppm)	239.2
ホウ素(ppm)	0.9
遊離酸化鉄(%)	2.0
リン酸・苦土比(重量比)	4.8
石灰・苦土比(重量比)	5.8

石灰飽和度(%) : 61.9 塩基飽和度(%) : 80.7 石灰・苦土比 : 4.2 苦土・加里比 : 3.6

所 見 (監修：上川農業改良普及センター TEL 0166-84-2017)

※不明な点は普及センターまで、御相談下さい。

- ①土壌pHは適正範囲内ですので、炭カルによる矯正は必要ありません(石灰は基準値の高めの値となっています)。
- ②リン酸値が高くなっていますので、リン酸含量の少ない肥料を使用して下さい。
- ③苦土、カリも基準値を若干超えていますので、標準施肥に努めて下さい。
- ④石灰・苦土比、苦土・加里比は基準内で良い状態です。
- ⑤硝酸態窒素は基準値内なので、窒素は標準施肥で良いと思われます。
- ⑥施肥例：NS248 80kg/10a(198g/坪)、サルボマグ 17kg/10a(56.1g/坪)

所見

- 土壌 pH や肥料三要素(窒素・リン酸・カリ)を中心に、北海道施肥ガイドに基づき診断します。
- 診断結果に基づき、今後の施肥対応や土づくりの方向性に関する処方が記載されます。
- 堆肥の使用量やほ場の面積など、個々の詳しい情報が「備考欄」に記載されている場合は、それらの影響を考慮した処方が可能です。
- 施肥例は一例です。施肥相談会における普及員との面談により、より良い対応や方向性を模索することも可能です。お気軽に御相談ください。

分析結果(表) 基準値

【水稻本田】	
・培養窒素	(土質による)6~10 mg/100g
・可給態ケイ酸	16 mg/100g 以上
・易還元性マンガン	100~1000 ppm
・遊離酸化鉄	2.0 %以上

【畑作】	
・CEC	(土質による)7~35 me/100g
・リン酸吸収係数	(土質による)700 前後
・熱水抽出性窒素	3~5 mg/100g
・可溶性銅	(土質による)0.3~8.0 ppm
・可溶性亜鉛	2~40 ppm
・易還元性マンガン	50~500 ppm
・ホウ素	0.5~1.0 ppm

【野菜・花き】	
・EC	(土質による)0.8 mS/cm 以下
・CEC	(土質による)7~35 me/100g
・リン酸吸収係数	(土質による)700 前後
・硝酸態窒素	5~10 mg/100g
・熱水抽出性窒素	3~5 mg/100g
・ホウ素	0.5~1.0 ppm

【水稻育苗床土】	
・リン酸・苦土比(重量比)	4.5 未満
・石灰・苦土比(重量比)	1.0~4.1

分析結果(塩基バランス) 基準値

	石灰飽和度	塩基飽和度	石灰・苦土比	苦土・加里比
水稻本田	-	-	-	-
畑作			6 以下	2 以上
野菜	40~60	60~80	4~8	
花き				2~4